KUKUŘICE
DEKALB

Nová generace výnosných silážních hybridů - výnos silážní hmoty, obsah škrobu, stravitelnost buněčných stěn.

Nová generace hybridů šlechtěných na vysokou toleranci k biotickým a abiotickým stresům.

Typ hybridu: Sc – dvouliniový, Tc – tříliniový
Typ zrna: D – koňský zub (dent), MD – mezityp až koňský zub, M – mezityp, MF – mezityp až tvrdý, F – tvrdý typ (flint)
Směr využití: S – siláž, Z – zrno, LKS – silážovaná drť kukuřičných palic s listeny, BP – bioplynová stanice
Způsob dozrávání rostliny: SG – stay green, RMZ – rovnoměrně dozrávající, PZ – pozvolné dozrávání, RD – rychle dozrávající

HYBRID	FAO		TYP			SMĚR VYUŽITÍ	OPTIMÁLNÍ HUSTOTA (tis. rost./ha)	ODOLNOST		
VJ POČET ZRN 50000	ZRNO	SILÁŽ	HYBRIDU	ZRNA	ROSTLINY			SUCHO	CHLAD A TĚŽKÉ PŮDY	LISTOVÉ CHOROBY
DKC3097	220	210	Sc	M	RMZ	S, Z	80-100	7	9	8
DKC3327	220	220	Sc	M	SG	S, BP, Z	80-100	8	8	8
DKC3149	240	240	Tc	MF	SG	S,Z	85-101	7	8	8
DKC3462	220	240	Sc	M	RMZ	S, Z	80-93	8	8	8
DKC3305		250	Tc	MD	RMZ	S, BP	80-100	8	8	8
DKC3419		250	Tc	M	RMZ	S, BP	80-98	8	9	9
DKC3418		260	Sc	M	RMZ	S, BP	78-93	8	9	9
DKC 3653		270	Sc	M	SG	S, BP	80-95	8	9	9
DKC3513		280	Tc	M	SG	S, BP	80-93	8	8	9
DKC4038		300	Sc	D	PZ/SG	S, BP	78-90	8	8	8
DKC5029		310	Sc	D	SG	S	76-92	9	7	8
DKC5110		320	Sc	Z	SG	S	75-90	8	8	9
DKC5432		340	Sc	D	SG	S	78-93	9	8	9
DKC5911		360	Sc	D	SG	BP	73-88	8	8	8
DKC3152	210		Sc	D	RD	Z	77-86	8	8	8
DKC3595	240		Sc	D	PZ	Z	73-86	8	8	8
DKC3752	250		Sc	Z	RMZ	Z	76-88	8	8	8
DKC3747	260		Sc	D	RD	Z	77-90	8	8	8
DKC3805	280		Sc	D	RMZ	Z	73-85	9	9	9
DKC3844	290		Sc	D	RD	Z	74-84	8	7	8
DKC4125	300		Sc	D	RMZ	Z	74-88	9	8	9
DKC4098	310		Sc	D	PZ	Z	73-83	9	8	8
DKC4253	310		Sc	Z	RMZ	Z	74-87	9	8	8
DKC4109	320		Sc	D	RMZ	Z	74-88	8	8	8
DKC4231	330		Sc	D	SG	Z	73-86	9	9	9
DKC4603	340		Sc	D	PZ	Z	70-85	8	8	9
DKC4728	360		Sc	D	RMZ	Z	73-89	9	9	8
DKC4741	370		Sc	D	RD	Z	69-82	8	8	9
DKC4897	380		Sc	D	RMZ	Z	69-82	8	7	9
DKC4933	400		Sc	D	RD	Z	65-83	8	8	9
DKC4611	350		Sc	D	RD	Z	67-80	8	8	9
DKC4391	340		Sc	D	RMZ	Z	70-82	8	8	9
DKC3400	250		Sc	D	RMZ	Z	78-90	8	8	9